

# Tableau d'alarme du MDS-Home-Care Suisse

On trouvera ci-dessous, pour les 30 domaines d'intervention répertoriés dans le RAI-Home-Care, la liste des items du MDS-HC (version suisse de novembre 2009) constituant les signaux d'alarme pour chaque domaine, ainsi que la valeur des codes requise pour que le signal s'allume.

Domaine d'intervention (N° et titre)	Signaux d'alarme du MDS-HC Suisse	Codes requis
1 <i>Activités de la vie quotidienne (AVQ) et potentiel de réadaptation</i>	B2 facultés cognitives pour les décisions courantes ●	0, 1, 2
	<b>ET</b>	
	<b><u>deux ou plus des éléments suivants:</u></b>	
	H2a mobilité dans le lit ●	2, 3, 4, 8
	H2b transfert ●	2, 3, 4, 8
	H2c marche à l'intérieur ●	2, 3, 4, 8
	H2d déplacement en chaise roulante sur le même étage ●	2, 3, 4
	H2e déplacement à l'extérieur ●	2, 3, 4, 8
	H2f s'habiller ●	2, 3, 4, 8
	H2g manger, boire ●	2, 3, 4, 8
	H2h utilisation des toilettes ●	2, 3, 4, 8
	H2i hygiène personnelle ●	2, 3, 4, 8
	H2j bain, douche ●	2, 3, 4, 8
	<b>ET</b>	
<b><u>un ou plus des éléments suivants</u></b>		
H3 déclin des AVQ (aggravation) ●	2	
H6a la cliente se sent capable d'atteindre une indépendance accrue pour les AVQ, AIVQ, la mobilité. ●	1	
H6b les aidants professionnels estiment que la cliente peut atteindre une indépendance fonctionnelle accrue ●	1	
Q2 changement global du degré d'indépendance (réévaluation. seulement) ●	2	
2 <i>Activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ)</i>	B2 facultés cognitives pour les décisions courantes ●	0, 1, 2
	<b>ET</b>	
	H6a la cliente se sent capable d'atteindre une indépendance accrue pour les AVQ, AIVQ, la mobilité.. ●	1
	<b>et/ou</b>	
	H6b les aidants professionnels estiment que la cliente peut atteindre une indépendance fonctionnelle accrue ●	1
	<b>ET</b>	
	<b><u>un ou plus des éléments suivants</u></b>	
H1a échelle A préparation des repas ●	1, 2, 3, 4	
H1c échelle B gestion de l'argent ●	1, 2, 3, 4	
H1d échelle C gestion des médicaments ●	1, 2, 3, 4	
3 <i>Promotion de la santé</i>	B2 facultés cognitives pour les décisions courantes ●	0, 1
	<b>ET</b>	
	<b><u>un ou plus des éléments suivants</u></b>	
	H4 monter/descendre les escaliers ●	1, 2
	H5a endurance ●	1
	<b>OU</b>	
B2 facultés cognitives pour les décisions courantes ●	0,1	
<b>et</b>		
K7b la cliente fume quotidiennement ●	1	

Domaine d'intervention (N° et titre)	Signaux d'alarme du MDS-HC Suisse	Codes requis
4 <i>Risque d'institutionnalisation</i>	<p><b>Trois ou plus des éléments suivants</b></p> <p>B3 signes d'état confusionnel aigu (délire) <b>un élément de a – c</b></p> <p>H1a échelle A préparation des repas</p> <p><b>et</b></p> <p>H1f échelle A faire les courses</p> <p>H2f s'habiller</p> <p><b>et/ou</b></p> <p>H2i hygiène personnelle</p> <p><b>et/ou</b></p> <p>H2j bain, douche</p> <p>I1 incontinence urinaire</p> <p>H3 déclin de la performance pour les AVQ</p> <p><b>et/ou</b></p> <p>Q2 changement global du degré d'indépendance (réévaluation seulement)</p>	<p>2</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>2, 3, 4</p> <p>2, 3, 4</p> <p>2, 3, 4</p> <p>2, 3</p> <p>2</p> <p>2</p>
5 <i>Troubles de la- communication</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>C3 audition</p> <p>C1 se faire comprendre</p>	<p>1, 2, 3</p> <p>1, 2, 3, 4</p>
6 <i>Fonction visuelle</i>	D1 vision	1, 2, 3
7 <i>Dangers liés à l'alcool</i>	K7a problèmes liés à la consommation d'alcool	1
8 <i>Cognition</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>B1a mémoire à court terme</p> <p>B2 facultés cognitives pour les décisions courantes</p> <p>B3 signes d'état confusionnel aigu (délire) <b>un élément de a – c</b></p> <p>B4 modification aiguë des capacités cognitives</p> <p>B5 déclin des facultés cognitives pour les décisions courantes</p>	<p>1</p> <p>2, 3, 4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>
9 <i>Comportement</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>E2a déambulation</p> <p>E2b agressivité verbale</p> <p>E2c agressivité corporelle</p> <p>E2d comportement social inadapté</p> <p>E2f résistance aux soins</p>	<p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p>
10 <i>Dépression et anxiété</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>E1b colère continue envers soi-même ou envers les autres</p> <p>E1c craintes paraissant non fondées</p> <p>E1d plaintes somatiques répétées</p> <p>E1e visage exprimant tristesse, douleur, inquiétude</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
11 <i>Maltraitance</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>K8a hygiène déplorable inusitée</p> <p>K8b blessures, fractures, brûlures ou hématomes inexplicables</p> <p>K8c contraintes physiques</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
12 <i>Rôle et fonction sociale</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>F2 changement dans les activités sociales</p> <p>F4 solitude</p>	<p>2</p> <p>1</p>
13 <i>Problèmes cardio-respiratoires</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>K2 essoufflement</p>	1, 2, 3
14 <i>Déshydratation</i>	<p><b>Un ou plus des éléments suivants</b></p> <p>K1a diarrhée</p> <p>K1e vomissements</p> <p>L2a insuffisance de liquides absorbés</p>	<p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1</p>

Domaine d'intervention (N° et titre)	Signaux d'alarme du MDS-HC Suisse	Codes requis
15 Chutes	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> B3 signes d'état confusionnel aigu (déliire) <b>un élément de a – c</b> B4 modification aiguë des capacités cognitives K5 chutes K6a démarche instable <b>et</b> K6b pas de limitation des sorties à l'extérieur	1, 2 1 1 1 0
16 Nutrition	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> L1ab indice de masse corporelle (IMC) L2a insuffisance de liquides absorbés L2b seulement un ou pas de repas L6 perte de poids	IMC ≤ 21 1 1 1
17 Santé buccale	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> L3 avaler L5 état bucco-dentaire	1, 2, 3, 4 1
18 Douleur	K4a présence de douleur P5e analgésique	1, 2, 3 1
19 Escarres (ulcères de pression)	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> H2a mobilité dans le lit I2 incontinence fécale M2 présence d'escarres	2, 3, 4, 8 2, 3 1, 2, 3, 4
20 Problèmes de la peau et des pieds	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> M1 problèmes de peau M4 problèmes des pieds	1 1
21 Adhésion aux traitements (par rapport à la prise de médicaments)	P6 adhésion aux traitements	1, 2
22 Fragilité du système d'aide informelle	<b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> H1a échelle A préparation des repas H1b échelle A faire le ménage H1c échelle A gestion de l'argent H1d échelle A gestion des médicaments H1e échelle A usage du téléphone H1f échelle A faire les courses <b>ET</b> <b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b> G1 existe-t-il un/des aidant(s)? G2a le(les) aidant(s) n'est plus en mesure de poursuivre son aide G2b le(les) aidant(s) exprime des sentiments de détresse, colère, dépression	1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 0 1 1
23 Gestion des médicaments	P1 nombre de médicaments pris <b>ET</b> P7 suivi médical de la médication	≥ 1 1
24 Soins palliatifs	<b>ATTENTION</b> Ce domaine n'est pas évalué dans le MDS-HC Suisse (voir explication dans le GAD). Le tableau d'alarme se base sur l'item FF2c du Formulaire administratif. FF2c la cliente reçoit des soins palliatifs	✓
25 Mesures préventives, vaccinations dépistage	<b>ATTENTION</b> Ce domaine n'est pas évalué dans le MDS-HC suisse (voir explication dans le GAD). L'équipe soignante se basera sur son expérience pour consulter ce GAD lorsque cela est nécessaire.	

Domaine d'intervention (N° et titre)	Signaux d'alarme du MDS-HC Suisse	Codes requis
26 <i>Médicaments psychotropes</i>	<p align="center"><b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b></p> <p>P5a antipsychotiques, neuroleptiques</p> <p>P5b anxiolytiques</p> <p>P5c antidépresseurs</p> <p align="center"><b>ET</b></p> <p align="center"><b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b></p> <p>B3 signes d'état confusionnel aigu (délire) un élément de a – c</p> <p>B4 modification aiguë des capacités cognitives</p> <p>B5 déclin des facultés cognitives à prendre les décisions courantes</p> <p>E1b colère continue envers soi ou envers les autres</p> <p>E1c craintes paraissant infondées</p> <p>E1d plaintes somatiques répétées</p> <p>E1e visage exprimant tristesse, douleur, inquiétude</p> <p>E2a déambulation</p> <p>E2b agressivité verbale</p> <p>E2c agressivité psychique</p> <p>E2d comportement social inadapté</p> <p>E2e résistance aux soins</p> <p>H2c marche à l'intérieur sur le même étage</p> <p>H2e déplacement à l'extérieur</p> <p>I1 incontinence urinaire</p> <p>I2 incontinence fécale</p> <p>K1j idées délirantes (qui influencent le comportement quotidien)</p> <p>K1k hallucinations (qui influencent le comportement quotidien)</p> <p>K5 chutes</p> <p>K6a démarche instable</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1, 2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2, 3, 4, 8</p> <p>2, 3, 4, 8</p> <p>2, 3</p> <p>2, 3</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p> <p>1</p> <p>1</p>
27 <i>Réduction de l'intervention des professionnels</i>	<p align="center"><b>SEULEMENT EN CAS DE REEVALUATION</b></p> <p>A2 raison de l'évaluation</p> <p align="center"><b>ET</b></p> <p>H6a potentiel de réadaptation du point de vue de la cliente</p> <p align="center"><b>ET</b></p> <p>H6b potentiel de réadaptation du point de vue des aidants professionnels</p> <p align="center"><b>ET</b></p> <p>Q2 changement global de l'état</p> <p align="center"><b>OU</b></p> <p>Q3 atteinte d'objectifs du traitement</p>	<p>2, 3, 4, 5</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p>
28 <i>Environnement physique</i>	N1 environnement physique	1
29 <i>Régulation intestinale</i>	<p align="center"><b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b></p> <p>I2 incontinence fécale</p> <p>K1a diarrhée</p> <p>K1b constipation</p>	<p>2, 3, 4</p> <p>1, 2</p> <p>1, 2</p>
30 <i>Incontinence urinaire et sonde à demeure</i>	<p align="center"><b><u>Un</u> ou plus des éléments suivants</b></p> <p>I1 incontinence urinaire</p> <p>I3a sonde urinaire avec collecteur</p> <p>I3b sonde urinaire avec valve anti-reflux</p> <p>I3f protections</p>	<p>2, 3, 4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>